

**Этапы профилактики диетической добавкой (ДД) и лечение лекарством
«Доновит-ВС» онкозаболеваний**

Этапы	Задачи	Действия	Ожидаемые результаты
0 этап Генная предрасположенность. До постановки диагноза.	Профилактика онкозаболевания.	По 3 таблетки ДД в сутки, рассасывая во рту	Снижение вероятности возникновения онкозаболевания, улучшение качества жизни.
1 этап Диагностирование онкозаболевания. Дооперационный этап.	«Капсулировать» и уменьшить опухоль. Укрепить иммунную систему.	За месяц до операции: - по 3 таблетки ДД три раза в день, рассасывая во рту. - лекарство по одной таблетке 2 раза в день, по инструкции.	Уменьшение опухоли и заключение её в «капсулу». Более успешное проведение операции. Возможность не операционного лечения.
2 этап Операция.	Удалить «закапсулированную» опухоль, а больным легче перенести операцию после предварительного курса лечения «Доновит-ВС» в течение 1-го месяца.	Удаление опухоли.	Удаление опухоли с меньшей вероятностью последующего метастазирования.
3 этап Химиотерапия, лучевая терапия.	Улучшить общую переносимость больного при химио и лучевой терапии, улучшить показатели крови и увеличить эффект от препаратов химиотерапии.	Как препарат сопровождения при химиотерапии: - по 3 таблетки ДД три раза в день, рассасывая во рту. - лекарство по одной таблетке 2 раза в день, по инструкции.	Увеличение срока безрецидивного течения онкозаболевания. Уменьшение общих отрицательных реакций (головные боли, тошнота, головокружение, изменение в анализах крови) при химио и лучевой терапии.
4 этап Профилактика метастазирования.	Уменьшить вероятность рецидива опухоли и возникновения метастазирования.	Длительно: - по 3 таблетки ДД три раза в день, рассасывая во рту (через 2-3 месяца можно перейти по 6 табл. в сутки). - лекарство по одной таблетке 2 раза в день, по инструкции (через 2-3 месяца можно перейти по 1 табл. в сутки). Периодический инструментальный контроль.	Уменьшение вероятности рецидива опухоли и возникновения метастазирования. Увеличение качества и продолжительности жизни.